

A young man and woman are smiling and embracing each other. The man is wearing a grey sweater and a dark scarf. The woman is wearing a grey knit beanie and a white top. They are outdoors, with a warm, golden light in the background, suggesting a sunset or sunrise.

AUTOVACUNAS BACTERIANAS

¿Padeces cistitis o prostatitis de repetición?

¿Qué es una vacuna bacteriana?

Es un tratamiento preventivo, que contiene las principales bacterias causantes de las infecciones del tracto urinario, de forma inactivada, por lo que dichas bacterias carecen de efecto patógeno, siendo su efecto beneficioso para el sistema inmunitario.

- ✓ GRAN EFECTIVIDAD EN LA CISTITIS DE REPETICIÓN
- ✓ TRATAMIENTO PROFILÁCTICO EFICAZ DE LA PROSTATITIS DE REPETICIÓN

¿Cómo actúa una vacuna bacteriana?

Una vacuna bacteriana es un tratamiento INMUNOESTIMULANTE, esto significa que la administración sublingual de una vacuna bacteriana produce las siguientes acciones:

- ✓ Mejora la respuesta inmune.
- ✓ Previene las infecciones del tracto urinario.
- ✓ Reduce el número de infecciones y recidivas.
- ✓ Mejora el umbral de defensa del organismo frente a las principales bacterias causantes de infecciones del tracto urinario.
- ✓ Reduce el consumo de antibióticos y medicación.

VACUNAS BACTERIANAS

TODAS LAS RESPUESTAS

01 BACTERIAS IMPLICADAS

El 90% de las infecciones del tracto urinario están causadas por una bacteria llamada *Escherichia coli*, siendo esta el principal agente causal. El 10% de las infecciones restantes están causadas por otras bacterias, tales como; *Proteus*, *Klebsiella*, *Enterococcus*...etc

02 VÍA DE ADMINISTRACIÓN

La vía de administración es sublingual, siendo la más efectiva para el tratamiento con vacunas bacterianas. La eficacia de la administración mucosa y la comodidad de aplicación, son dos de las principales ventajas.

03 COMO SE ADMINISTRA

Se administra de forma diaria, debajo de la lengua.

El dispositivo en spray, garantiza una rápida absorción, sin el efecto de acumulación de la solución en la cavidad oral.

04 DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

La vacuna se administrará en su domicilio durante 3 meses y medio. Pasado ese tiempo, su urólogo valorará la necesidad de repetición del tratamiento en un futuro.

*Para más información consulte a su urólogo o especialista